

**DA STECKT
MEHR DRIN!**

UNSERE THERAPIESCHUHE
JETZT AUCH MIT DEUTLICH
MEHR VOLUMEN.



VERORDNUNGSMATRIX

Diagnose	STABIL	VARIO STABIL	REHA STABIL
	HiMi-Nr 31.03.03.0001	HiMi-Nr 31.03.03.1000	HiMi-Nr 31.03.03.2009
Achillessehnenruptur (konservativ und postoperativ)		✓	
Achillodynie (konservativ und postoperativ)	✓	✓	
Arthrodese oberes Sprunggelenk (1)		✓ (plus bettende Einlage)	
Arthrodese unteres Sprunggelenk (1)	✓ (plus bettende Einlage)		
Arthrose oberes Sprunggelenk	✓ (plus bettende Einlage)	✓ (plus bettende Einlage)	
Arthrose unteres Sprunggelenk	✓ (plus bettende Einlage)		
Bandläsion Sprunggelenk (konservativ und postoperativ)	✓		
Ruhigstellung im Bereich Fußwurzel und Mittelfuß	✓ (plus Sohlenversteifung(3) und ggf. Abrollhilfe(4))		
Ruptur des Syndesmosenbandes (2)	✓		
Weber A Fraktur	✓		
Weber B Fraktur (2)	✓		
Weber C Fraktur (2)		✓	
Zustand nach Schlaganfall			✓
Schlaffe Lähmung			✓
Spastische Lähmung			✓

- (1) Bei der Arthrodese des OSG oder/und USG ist eine postoperative Belastung in der Regel für mehrere (6) Wochen nicht erlaubt.
Therapieschuh für den Belastungsaufbau nach Freigabe durch den behandelnden Arzt/Operateur.
- (2) Eine Belastung des verletzten Fußes sowohl bei konservativer Versorgung, als auch postoperativ ist zunächst nicht erlaubt.
Therapieschuh für den Belastungsaufbau nach Freigabe durch den behandelnden Arzt/Operateur.
- (3) HiMi-Nr. 31.03.02.4000
- (4) HiMi-Nr. 23.99.99.2609